

		<b>Boscalid 500 WG ®</b>			<b>00A479-00</b>	
Wirkstoff	Boscalid 500g als Wasserdispersierbares Granulat					
Wirkstoffgruppe	FRAC C2					
Wirkungsweise	Systemisches Fungizid					
Indikation	Winterraps					
Gebinde	2,5 kg Boscalid 500 WG					
	Kultur	Schaderreger	Aufwand menge	BBCH	Anwendun g	Wartezeit
Indikationen	Winterraps	Weißstängeligkeit (Sclerotinia sclerotiorum)	0,5 kg/ha in 200-400 L Wasser/ha	Einzelblüten der sekundären Infloreszenzen sichtbar (geschlossen) bis Ende der Blüte (BBCH 57-69). Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	1 x pro Jahr und 2 x pro Kultur	F
		Wurzelhals-und Stängelfäule (Leptosharia maculans)		Bis Erste Blütenblätter sichtbar; Blüten noch geschlossen (bis BBCH 59), bei Befallsbeginn bis Mitte Oktober und im Frühjahr nach Vegetationsbeginn bis Ende der Blüte, bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	2 x pro Jahr und 2 x pro Kultur*	F
		Rapsschwärze (Alternaria brassicae)		Nach Öffnung von 50-60% der Blüten / (BBCH 65) , bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	1 x pro Jahr und 2 x pro Kultur	F
Anwendungs bestimmungen	Gewässer		NW 642-1	Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässer oder Küstengewässern ist nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.		
	Bienen		NB6641	bienenungefährlich (B4)		
			NN1001	Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft		
			NN1002	Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft		